



Что должно беспокоить родителей в ребенке

В возрасте до года:


- Выраженная тревожность, крикливость;
- Нарушение сна;
- Плохой аппетит, частые срыгивания;
- Плохая прибавка в весе;
- Плохая реакция на звук и свет;
- Очень сильная (чрезмерная) реакция на звук и свет;
- Нарушение тонуса мышц, судороги;
- Повышение внутричерепного давления;
- Частые простудные заболевания;
- Тяжелые заболевания (с применением больших доз антибиотиков и других препаратов), операции.

В возрасте от 3 до 5 лет:

- Чрезмерно беспокойное поведение, неусидчивость, импульсивность;
- Раздражительность, плаксивость, резкая смена настроения;



- Чрезмерная медлительность, вялость апатичность;
- Плохой сон (медленно засыпает, вскрикивает во сне, часто просыпается и т. п.);
- Страхи (боязнь темноты, одиночества, ночные страхи);
- Тики (непроизвольное подергивание век, мышц лица, шеи, навязчивые движения, обкусывание ногтей);
- Хронические заболевания;
- Трудности контактов со сверстниками и взрослыми;
- Сниженная острота зрения (близорукость, дальнозоркость), косоглазие и другие нарушения зрения;
- Задержка в речевом развитии (появление связной речи к 3 годам и позже), дефекты звукопроизношения;
- Заикание.



В возрасте 5-6 лет:



- Частые хронические заболевания, операции, травмы;
- Импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание «хочу» над «можно»)
- Чрезмерная (бесцельная) двигательная активность, непоседливость, крикливость, раздражительность, настойчивая болтовня;
- Нарушение сна;
- Страхи;
- Навязчивые движения, кривляния;
- Боязнь новых вещей, чужих людей, возникающих впервые ситуаций;
- Трудность общения с незнакомыми сверстниками, взрослыми.

